

# 消毒薬「ロンテクト」使用し消毒を徹底して、疾病の進入を防ぎましょう!

## 疾病の進入を防ぐ消毒のポイント

### 1. 農場に出入りする車両

消毒薬「ロンテクト」 500~1,000倍

農場に出入りする車両は必要最小限にとどめる。  
従業員、訪問者の車両は農場外に駐車させる。  
飼料運搬車等止むおえない車両は農場の入り口に消毒場所、消毒装置を設け、十分に消毒してから農場に出入りさせる。



車両消毒



ココがポイント!  
タイヤハウス, 車両底面を重点的に

### 2. 農場に出入りする人(踏み込み消毒槽)

消毒薬「ロンテクト」 500倍

農場に出入りする人は必要最小限にとどめる。  
入り口に踏み込み消毒槽を設置して必ず靴の裏を消毒してから農場に出入りさせる

ココがポイント!

- ①浅めの消毒槽に人工芝を入れて、長靴以外の靴も確実に消毒させる
- ②消毒液は毎日交換
- ③乾いたらすぐに消毒剤を入れる



### 3. 鶏舎の出入り

消毒薬「ロンテクト」 500倍

鶏舎ごとに踏み込み消毒槽を設置して、出入りするたびに長靴の消毒を行う。  
できれば各鶏舎に専用長靴を用意し、使用後は踏み込み消毒槽に漬けて置く

ココがポイント!

- ①鶏舎ごとに担当者を決めて、担当者以外は鶏舎へ入らないように
- ②消毒液は毎日交換

#### 4. 飼養中の消毒

**消毒薬「ロンテクト」 500~2,000倍**

毎日1~3回程度消毒剤を散布する。

夏場は細霧冷房の水にロンテクトを添加しても良い

**ココがポイント！**

細かい霧状にして鶏舎全体が湿るようにする。

※注：休業期間が設定されました。鶏：と畜前3日間。

#### 5. 畜舎内(オールアウト後の消毒)

**消毒薬「ロンテクト」 500~2,000倍**

オールイン・オールアウトによる管理を行い、アウト後の洗浄・消毒を十分に行う。

**ココがポイント！**

- ①洗浄を十分に行い、糞便などの有機物をよく取り除いてから消毒を行う
- ②畜舎内の床、壁だけではなく、天井も一緒に洗浄・消毒



#### 消毒剤作成量と

#### 消毒剤「ロンテクト」・「オーチストン」量

水の量	ロンテクトの量			オーチストンの量	
	50倍希釈 (発泡消毒)	500倍 希釈	1000倍 希釈	100倍 希釈	500倍 希釈
10ℓ	200ml	20ml	10ml	100ml	20ml
20ℓ	400ml	40ml	20ml	200ml	40ml
50ℓ	1ℓ	100ml	50ml	500ml	100ml
100ℓ	2ℓ	200ml	100ml	1ℓ	200ml
300ℓ	6ℓ	600ml	300ml	3ℓ	600ml
500ℓ	10ℓ	1ℓ	500ml	5ℓ	1ℓ
1000ℓ	20ℓ	2ℓ	1ℓ	10ℓ	2ℓ



鶏舎の外には消石灰を散布する



**ココがポイント！**

- ③床や壁は発泡消毒で、消毒効果をアップさせる
- ④コクシジウムオーシスト対策で、最後にオーチストン 100~500倍 を散布する。



株式会社 **科学飼料研究所**

〒104-0045 東京都中央区築地1-12-6

<http://www.kashiken.co.jp/>

動薬部

札幌事業所

東北事業所

関東事業所

TEL:027-347-3223

TEL:011-214-3656

TEL:019-637-6050

TEL:043-486-5640

FAX:027-347-4577

北九州事業所 TEL:096-294-8322

南九州事業所 TEL:099-482-3044