

Basic 標準代用乳

ミルフイット

バランスのとれた標準的な代用乳です。



特許取得!
(第4274559号)



SPG製法

SPGとはSPray dry & Granulationの略で、溶解性、流動性に優れた代用乳を実現するために全農グループが開発した代用乳製造法で、特許を取得しています(第4274559号) スプレードライヤーによる粉末油脂の製造(Spray dry)と、流動層造粒装置を用いた粉末油脂と粉末原料での造粒(Granulation)という二段階による、画期的な製造法です。

ミルフィット

特 徴

★ミルフィットの成分は、脱脂粉乳を多く使用し、バランスのとれた標準的な成分です。また、子牛の健康をサポートする乳酸菌、ビフィズス菌や各種ミネラル、ビタミンをバランスよく使用しています。すべての品種、性別を問わず給与可能です。

★消化吸収の良い中鎖脂肪酸を豊富に含む植物油脂を使用しています。

★SPG製法による製造で、お湯に溶けやすく、油脂分離が少なく、洗浄がしやすい代用乳です。自動ほ乳装置との相性も抜群です。

SPG製法だからこんなにきれいに！



溶解直後



洗浄後

保 証 成 分

粗たん白質	粗脂肪	粗繊維	粗灰分	カルシウム	リン	TDN
25.0%以上	21.0%以上	1.0%以下	10.0%以下	0.8%以上	0.6%以上	110%以上

給 与 例

《ホルスタイン種子牛の場合》

日 齢	0	5	8	22	29	43
初乳移行乳			600g/日	800g/日 ミルフィット	600g/日	400g/日
人工乳	不断給与(摂取目安) 200g/日 400g/日 700g/日					
良質乾草	不断給与					
お湯(または水)	不断給水					

《黒毛和種子牛、F1子牛の場合》

日 齢	0	8	15	43	50	57
初乳移行乳			600g/日	800g/日 ミルフィット	600g/日	400g/日
人工乳	不断給与(摂取目安) 200g/日 400g/日 800g/日					
良質乾草	不断給与					
お湯(または水)	不断給水					

給与のポイント

- ① 給与量は子牛の状態に応じて加減してください。
- ② お湯1.0ℓに対して、ミルフィット160g程度を目安に溶かしてください。
- ③ 溶かしたミルフィットを約40℃で与えるよう、季節を考慮してお湯の温度を調整してください。
- ④ 離乳の目安は、少なくとも人工乳700g/日を3日以上安定的に摂取する時期としてください。
- ⑤ 自動ほ乳装置では、ミルフィットのホッパーからの排出量を時々確認してください。

お問合せはお近くのJAグループまで